

# பாகற்காய் சாகுபடி



**Rediar Chattiram Seed  
Growers Association**



**COMMONWEALTH of LEARNING**

*Learning for Sustainable Development*



வ.எண்	பொருளடக்கம்	பக்கம்
1	பட்டம்	4
2	பாகற்காய் சாகுபடி 1	4
3	பாகற்காய் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் 2	4
4	பாகற்காய் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் 3	4
5	பாகற்காய் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் 4	4
6	பாகற்காய் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் 5	4
7	பாகற்காய் குழி நடவு தொழில்நுட்பம்	5
8	நிலம் தயாரிப்பு	5
9	தொழுஉரம்	5
10	ரகம்	5
11	பயிர் இடைவெளி	6
12	விதை அளவு	6
13	விதை நேர்த்தி	6
14	உர நிர்வாகம்	6
15	நுண்ணூரம்	6
16	நீர் நிர்வாகம்	6



17	களை நிர்வாகம்	6
18	இலைபேன் தாக்குதல்	6
19	கோலப்பூச்சி தாக்குதல்	7
20	நூற்புழு தாக்குதல்	7
21	காய்ப்புழு தாக்குதல்	7
22	மஞ்சள் இலை வைரஸ் நோய் தாக்குதல்	8
23	அறுவடை தொழில்நுட்பம்	8

## பாகல் சாகுபடி தொழில் நுட்பம்

பட்டம் :

சித்திரை, ஆடி, ஆவணி.

### பாகற்காய் சாகுபடி 1

பந்தல் முறையில் பாவை சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் வரிசை நடவு முறையை பயன்படுத்தி வந்தார்கள் தற்சமையம் தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருப்பதால் குழி நடவு முறையை பயன்படுத்தி ( சொட்டு நீர் போட்டு அதிக மகசூல் எடுத்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் குரும்பபட்டியை சேர்ந்த திரு . நல்லதம்பி என்ற விவசாயி நான் குழி நடவு முறையை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்தால் எனக்கு களையை குறைக்க முடிந்தது, தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருப்பதால் நான் சொட்டு நீர் பாசனமுறையை பின்பற்றியதன் விளைவாக எனக்கு செலவு குறைவு மகசூல் அதிகமாகவே கிடைக்கிறது என்கிறார்.

<https://www.youtube.com/watch?v=lcXvxEhCicl>

### பாகற்காய் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் 2

<https://www.youtube.com/watch?v=ettN00iXnhY>

### பாகற்காய் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் 3

<https://www.youtube.com/watch?v=ildTRh8ZHAE>

### பாகற்காய் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் 4

<https://www.youtube.com/watch?v=ltR8pbIDz5w>

### பாகற்காய் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் 5

<https://www.youtube.com/watch?v=0Hed4780-iM>

பாகற்காய் குழி நடவு தொழில்நுட்பம்

<https://www.youtube.com/watch?v=djSbNeBpbaA>

விதை அளவு :

சாதாரகம் 1 கிலோ, ஒட்டு ரகமாக இருந்தால் 600 கிராம்

**விதை நேர்த்தி**

1 கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் டிரைக்கோடெர்மா விரிடி விதை நேர்த்தி செய்து நடவேண்டும். 200 கிராம் ரைசோபியம், 200 கிராம் பாஸ்;போபாக்டீரியா இரண்டையும் ஆறிய வடி கஞ்சியில் போட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு தேவையான விதையுடன் கலந்து 24 மணி நேரத்திற்குள் நடவு செய்யவேண்டும்.

**நிலம் தயாரிப்பு**

3 முதல் 4 உழவுகள் வரை போடவேண்டும் மண் நன்றா கட்டி இல்லாமல் பொழ பொழுவென உழுது இருக்க வேண்டும். களைகள் மற்றும் பிளாடிக் பொருட்கள் , கல் முதலியவை இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும்

**தொழுஉரம்**

ஏக்கருக்கு 4 டன் தொழுஉரம் அல்லது மண்புழு உரம் 1 டன் இட வேண்டும். ஆட்டுக்கிடை அமர்த்தி நட்டால் பயிர் நன்கு வளரும், அதிக மகசூல் தரும். விதை நட்ட5ம் நாள் 2 கிலோ அசோஸ்பைரில்லம், 2 கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியாவை நன்கு மக்கிய பழைய ஆறிய எருவில் கலந்து வயலில் ஈரம் இருக்கும் போது விதைக்க வேண்டும்.

**ரகம் :**

மெழுகுபாவை, குருந்தலைபாவை, மிதிபாவை. ஒட்டு ரகம்

### **நுண்ணூரம்**

நுண்ணூரம் ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோவை 15 கிலோ மணலுடன் கலந்து தூவிவிட வேண்டும்.

### **பயிர் இடைவெளி**

வரிசைக்கு வரிசை 10 அடி, செடிக்கு செடி 2 அடி

### **களை நிர்வாகம்**

சிறிய செடியாக இருக்கும் போது களைகள் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை வெட்ட வேண்டும். செடி வளர்ந்து பந்தலை அடைத்துவிட்டால் மாதம் ஒரு முறை களை எடுத்து உரம் போட வேண்டும்.

### **நீர் நிர்வாகம்**

4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும். மேலும் காய் அறுவடைக்கு முதல் நாள் தண்ணீர் விட்டுத்தான் அறுவடை செய்ய வேண்டும். காய் அறுவடை செய்த பின் மறு நாளே தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.

### **உர நிர்வாகம்**

20 நாட்களுக்கு ஒருமுறை களை வெட்டி 1 ஏக்கருக்கு டி.ஏ.பி. 25 கிலோ பொட்டாஷ் 25 கிலோ இரண்டையும் சமபங்காக பிரித்து இரண்டு முறை இடவேண்டும்.

### **இலைப்பேன் தாக்குதலின் அறிகுறி**

பயிர் நடவுசெய்த 25 ம் நாள் இலையின் மேல் எறும்பு இருக்கும். இலையின் உள் பகுதி மடங்கி இருக்கும்.

### **கட்டுப்படுத்தும்முறை**

இமிடாகுளோர் ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு மில்லி என்ற அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

### **கோலப்பூச்சி தாக்குதலின் அறிகுறி**

இலையின் பின்புறம் கோடுகோடாக இருக்கும்.

### **கட்டுப்படுத்தும் முறை**

மோனோகுரோட்டோபாஸ் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 மில்லி என்ற அளவில் கலந்து மாலை வேளையில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

### **நூற்புழு தாக்குதலின் அறிகுறி**

செடியின் தண்டுப்பகுதி பூமியில் இருந்து 1 அடிக்கு மேல் வீங்கி காணப்படும். தண்டுப்பகுதி வீங்கி இருந்தால் செடியின் காய்ப்புத்தன்மை, வளர்ச்சி குறையும், மகசூல் பாதிக்கும்.

### **கட்டுப்படுத்தும் முறை**

விதை நட்ட 15 முதல் 20 நாட்களுக்குள் பியூரடான் 5 கிலோவை 20 கிலோ வேப்பம்புண்ணாக்கில் கலந்து தூவ வேண்டும்.

### **காய்ப்புழு தாக்குதலின் அறிகுறி**

பூ, பிஞ்சு, காய் முதலியவற்றை தாக்கும்.

### **கட்டுப்படுத்தும் முறை (இயற்கை முறை)**

டிரைக்கோகிரம்மா முட்டை ஒட்டுண்ணி அட்டை கட்டலாம். 1 ஏக்கருக்கு 4 சிசி இனக்கவர்ச்சிப்பொறி ஒரு ஏக்கருக்கு 6 இடத்தில் பயிருக்கு ஒரு அடிக்கு மேல் வைத்து கட்ட வேண்டும்.

### **கட்டுப்படுத்தும் முறை (இரசாயன முறையில் )**

ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 மில்லி எண்டோசல்பான் அல்லது குளோரிபைரிபாஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்றை கலந்து தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

**மஞ்சள் இலை வைரஸ் நோய் தாக்குதலின் அறிகுறி**

இலை சுருண்டு சிறுத்து, பழுத்து மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும்.

**கட்டுப்படுத்தும்முறை,**

மூன்று நாள் புளித்த தயிரை மாலை வேலையில் தெளிக்க வேண்டும். ஸ்டெப்டோ சைக்கிளின் 12 கிராம் அல்லது பிளாண்டோ மைசின் 50 கிராம் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்

**அறுவடை தொழில்நுட்பம்**

வாரம் ஒரு முறை காய்களை அறுவடை செய்ய வேண்டும்.